



Основним джерелом патогенних для людей серогруп лептоспір у природних і антропогенних біотопах, населених пунктах залишаються хатня, польова, лісова миші, сірі щурі, звичайна та руда полівка.

В Херсонській області 65 % захворілих складають пенсіонери та не працюючі особи.

Ускладненню перебігу хвороби у захворілих та збільшенню ризику летальних наслідків сприяють несвоєчасні виявлення, діагностика та госпіталізація хворих.

Велике значення має проведення санітарно-освітньої роботи. На допомогу медичним працівникам та для розповсюдження серед населення додаємо інформацію.

ЛЕПТОСПІРОЗ (ПАМ'ЯТКА ДЛЯ НАСЕЛЕННЯ)

Лептоспіроз — гостре інфекційне захворювання, що вражає людей і тварин (раніше це захворювання

Лептоспіри потрапляють у водойми із сечею хворих тварин, де вони можуть зберігатися до 300 д

Від моменту попадання збудників в організм людини до початку захворювання проходить у серед

Без своєчасного лікування захворювання лептоспірозом може призвести до тяжких наслідків з в

Від людини людині лептоспіроз не передається.

Профілактика

лептоспірозу баз

Величезне значення мають захист житла, продуктових складів та інших об'єктів від проникнення

Купатися необхідно в спеціально відведених місцях. Зараження лептоспірозом частіше відбуваєт

Бажано відмовитись від прогулянок босоніж у заболочених місцевостях.

На польових роботах, риболовлі, полюванні, догляді за хворою худобою необхідно обов'язково д

Забороняється вживати в їжу м'ясо і молоко хворих на лептоспіроз тварин, сиру воду з відкритих джерел.

Обов'язково потрібна вакцинація собак.

Якщо мав місце ризик інфікування та з'явилися перші ознаки захворювання, а саме – підвищення температури тіла, головний біль, біль у м'язах, нудота, блювота, діарея, то необхідно звернутися до лікаря.

При початку лікування пізніше 4 доби захворювання летальність при лептоспірозі зростає.

Підготувала головний позаштатний інфекціоніст УОЗ міської ради О.І. Демедюк